

Excilor® FORTE

Do leczenia grzybiczego zakażenia paznokci palców stóp (onychomykoza)

Co to jest onychomykoza?

Onychomykoza to grzybicze zakażenie paznokci wywołane przez dermatofity. Zakażenie zwykle rozpoczyna się na brzegu paznokcia i zmienia jego kolor na biało-żółty, brązowy lub zielony. Grzyb wraść pod paznokieć lub w głąb paznokcia powodując pogrubienie i łamanie się płytki paznokciowej. Czasami zniekształcony paznokieć ulega częściowemu lub całkowitemu oderwaniu, co może być bolesne.

W jaki sposób można zarazić się grzybicą paznokci?

Grzybicze zakażenie paznokci jest często spowodowane nadmierną wilgocią, wysoką temperaturą, poceniem, starzeniem lub osłabieniem układu odpornościowego. W normalnych warunkach płytka paznokciowa jest zbyt gruba, aby grzyby mogły przeniknąć. Jednak uszkodzone paznokcie mogą łatwo ulec zakażeniu. Zbyt ciasne obuwie i/lub pocące się stopy stwarzają warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania się grzybów. Zakażenia grzybicze są zaraźliwe i mogą przenosić się na inne osoby (np. podczas korzystania ze wspólnych pryszniców). Możliwe jest również samozakażenie: zakażenie może przenieść się z jednego paznokcia na drugi. Niektóre osoby (diabetycy, osoby w podeszłym wieku, pacjenci przyjmujący kortykosteroidy, pacjenci z osłabionym układem odpornościowym) są bardziej podatne na zakażenia grzybicze. Dlatego ważne jest, jak najszybsze leczenie zakażeń grzybiczych paznokci: im mniejszy jest zakażony obszar, tym krótszy okres leczenia. Wczesne rozpoczęcie leczenia może również zapobiec rozprzestrzenieniu się zakażenia na inne paznokcie.

Jak zapobiegać grzybiczym infekcjom paznokci?

- Regularnie myj stopy. Jeśli używasz mydła, na koniec mycia dokładnie oplucz stopy, aby usunąć jego pozostałości.
- Dokładnie osusz stopy, szczególnie między palcami.
- Noś czyste bawełniane lub wełniane skarpety.
- Noś obuwie, które pozwala stopom „oddychać” i nie jest zbyt ciasne.
- Regularnie wymieniaj obuwie.
- Stosuj preparat przeciwgrzybiczy do obuwia.
- Noś kłapki, w miejscach gdzie wiele osób chodzi boszo, np. wspólne prysznice, przebieralnie i baseny.

Excilor® FORTE

W jaki sposób Excilor® FORTE leczy grzybicę paznokci?

Najważniejszym składnikiem paznokcia u stóp i palców jest keratyna twarda i gęsta substancja przez którą większość preparatów przeciwgrzybiczych nie jest w stanie przeniknąć. W większości przypadków grzyby rozwijają się pod paznokciem, co utrudnia leczenie. Excilor® FORTE zmienia środowisko paznokcia, zakwaszając łożysko paznokcia. Excilor® FORTE zawiera kwasowe substancje, które wykazują zdolność wnikania w paznokieć, dzięki czemu leczenie obejmuje jego całość. Zakażony paznokieć zwykle odzyskuje całkowicie zdrowy wygląd w ciągu kilku miesięcy. Paznokieć palca stopy wzrasta przeciętnie w tempie 1,5 mm na miesiąc. Excilor® FORTE natychmiast obniża pH paznokcia, tworząc niekorzystne środowisko dla rozwoju grzybów. Uszkodzony paznokieć potrzebuje jednak czasu, aby odrosnąć. Skuteczność preparatu Excilor® FORTE potwierdzono w badaniach klinicznych.

Instrukcja używania



Excilor® FORTE Należy stosować raz dziennie, najlepiej po kąpieli. Przed aplikacją należy wyczyścić paznokcie i zdjąć stary lakier do paznokci. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką.



Następnie, do pokrycia całej powierzchni paznokcia użyć pędzelka. Należy upewnić się, że nałożono odpowiednią ilość preparatu **Excilor® FORTE**. Butelka może zawierać grudki zaschniętego lakieru. Zdjąć wszystkie grudki zaschniętego lakieru z pędzelka. Jest to normalny efekt, spowodowany kontaktem lakieru z powietrzem. Nie ma to wpływu na jakość czy wydajność produktu.



Pozwolić lakierowi wyschnąć na paznokciu. Zajmuje to od 3 do 5 minut. Produkt po nałożeniu jest biały, ale kiedy wyschnie staje się przezroczystą gumową powłoką, która z czasem będzie się zmniejszać. W celu uzyskania najlepszego efektu należy odczekać 5 minut przed założeniem skarpetki lub buta. Po nałożeniu preparatu odczuwalne może być mrowienie pod paznokciem, oznaczające, że wniknął w paznokieć.



Powstała powłoka jest wodoodporna i wytrzymuje normalne tarcie ze strony obuwia. Powłoka może odpryskiwać na krawędziach paznokcia, ale nie ma to wpływu na skuteczność produktu. Nałożona warstwa jest kompatybilna z lakierem do paznokci i można go stosować po wyschnięciu preparatu.



Po 24 godzinach, usunąć starą warstwę. Można to zrobić poprzez odklejenie powłoki na brzegu lub boku paznokcia. **Delikatnie zwiąć starą warstwę, aż do momentu usunięcia z paznokcia.** Można to ułatwić przy użyciu ciepłej wody. Nałożyć nową warstwę, zgodnie z instrukcją powyżej. Dokładnie umyć ręce po każdym usunięciu i kolejnej aplikacji. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy leczyć cały paznokieć przez co najmniej trzy miesiące i kontynuować kurację aż do całkowitego wyleczenia paznokcia.

Należy upewnić się, że butelka jest szczelnie zamknięta po każdym użyciu produktu, aby uniknąć parowania. Na wieczku butelki może powstać warstwa zaschniętego lakieru.

Excilor® FORTE jest dostępny w butelce 30ml.

Działania niepożądane

Uczucie pieczenia, świądu lub łagodny, miejscowy ból.

Ryzyko uczulenia u pacjentów z nadwrażliwością, w wywiadzie, na jeden lub kilka składników preparatu.

W przypadku podejrzenia wystąpienia incydentów lub w przypadku reklamacji związanych z tym produktem prosimy o kontakt z producentem za pośrednictwem strony internetowej www.excilor.com. Jest to istotne z uwagi na ciągłe monitorowanie stosunku korzyści ze stosowania produktu do ryzyka z nim związanego. Ponadto w przypadku podejrzenia wystąpienia poważnych incydentów związanych z tym produktem prosimy o kontakt z producentem za pośrednictwem strony internetowej www.excilor.com oraz do URPL.

Środki ostrożności

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

Stosować wyłącznie na paznokcie, unikać kontaktu z otaczającą skórą.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi obficie spłukać wodą.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Diabetycy, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania **Excilor® FORTE**.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniu, w temperaturze pokojowej (5-25°C), z dala od źródeł ciepła i bezpośrednio działających promieni słonecznych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką.

Skład

Woda, poliuretan, olejek z mięty pieprzowej, kwas octowy, seskwioleinian sorbitanu, haksanodiol, oktanodiol, alkohol benzylowy, galusan oktylu, alkohol etoksylanolinowy i alkohol acetonolinowy, fenoksytanol, butylokarbaminian jodopropynyli, guma ksantanowa, kwas dehydrooctowy, etyloheksylogliceryna, biotylna. Nie zawiera parabenów.

Patent w toku.

Objaśnienie symboli



Europejska procedura oceny zgodności dla wyrobów medycznych



Wyrób medyczny



Instrukcja użycia



Ostrzeżenie



Limit temperatury



Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego



Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci



Seria



Termin ważności



Producent



Dystrybutor

Ostatnia aktualizacja instrukcji: sierpień 2021