

Excilor®

Leczenie grzybicy paznokci

Wzbogacony w glicerol, lipidy pielęgnujące paznokcie oraz biotyne Co to jest grzybica paznokci?

Grzybica paznokci (znana również jako onychomykoza) to zakażenie paznokci palców rąk lub stóp wywołane przez grzyby (dermatofity). Zakażenie zwykle rozpoczyna się na brzegu paznokcia, który następnie przebarwia się na kolor białawo-żółty, brązowy lub zielony. Grzyby rosną pod paznokciem albo wrastają w paznokieć, powodując pogrubienie i kruszenie się płytki paznokciowej. Czasami dochodzi do częściowego lub całkowitego oddzielenia się paznokcia, co może być bolesne. W niektórych przypadkach paznokieć odpada.

W jaki sposób można zarazić się grzybicą paznokci?

Do zakażeń grzybiczych paznokci — najczęściej palców stóp — dochodzi wskutek nadmiernej wilgoci, zbyt wysokiej temperatury, nadmiernego pocenia się, a także braku higieny. Płytki paznokciowa zwykle jest zbyt gruba, aby grzyby mogły przez nią przeniknąć, natomiast uszkodzone paznokcie mogą łatwo ulec zakażeniu. Zbyt ciasne obuwie i/ lub pocące się stopy stwarzają odpowiednie warunki dla rozwoju i rozprzestrzeniania się grzybów. Zakażenia grzybicze są zaraźliwe i mogą przenosić się na inne osoby (np. pod prysznicami w miejscach publicznych). Możliwe jest też samozakażenie, czyli rozprzestrzenianie się zakażenia z jednego paznokcia na kolejny. Niektóre osoby (diabetycy, osoby w podeszłym wieku, pacjenci przyjmujący kortykosteroidy, pacjenci z osłabionym układem odpornościowym) są bardziej podatne na infekcje grzybicze. Leczenie grzybicy paznokci należy rozpoczynać jak najwcześniej — im mniejszy obszar jest nią objęty, tym krótsze leczenie. Szybkie rozpoczęcie leczenia może zapobiec rozprzestrzenieniu się zakażenia na inne paznokcie.

Zalecenia dotyczące zapobiegania grzybicy paznokci:

- Regularnie myj stopy. Jeśli używasz mydła, na koniec mycia dokładnie oplucz stopy, aby usunąć jego pozostałości.
- Dokładnie osusz stopy, szczególnie między palcami.
- Noś czyste skarpetki bawełniane lub wełniane.
- Noś obuwie, które pozwala stopom „oddychać” i nie jest zbyt ciasne. Regularnie zmieniaj obuwie.
- Stosuj produkt przeciwgrzybiczy wewnątrz obuwia.
- Noś klapki w miejscach, gdzie wiele osób chodzi boso np. publiczne prysznice, przymierzalnie i baseny.

Excilor® wskazany jest do leczenia grzybicy paznokci.

W jaki sposób Excilor® leczy grzybicę paznokci?

Najważniejszym składnikiem paznokci są włókna keratyny, przez które większość preparatów przeciwgrzybiczych nie jest w stanie przeniknąć. W większości przypadków grzyby rozwijają się pod paznokciem, co utrudnia leczenie.

Excilor® zmienia mikrośrodowisko paznokcia, zakwaszając łożysko paznokcia. Excilor® wykazuje zdolność wnikania w paznokieć, dzięki czemu leczenie obejmuje jego całość. Zakażony paznokieć zwykle odzyskuje całkowicie zdrowy wygląd w ciągu kilku miesięcy. Paznokieć palca stopy wzrasta przeciętnie w tempie 1,5 mm na miesiąc. Excilor® natychmiast obniża pH paznokcia, tworząc niekorzystne środowisko dla rozwoju grzybów. Uszkodzony paznokieć potrzebuje jednak czasu, aby odrosnąć.

Skuteczność preparatu Excilor® potwierdzono w badaniach klinicznych.

Excilor® wzbogacony jest w glicerol, lipidy pielęgnujące paznokcie oraz biotyne

Pod względem budowy płytkę paznokciową można porównać do muru z cegieł, w którym „ceglami” są komórki paznokciowe, a „cementem” — lipidy znajdujące się między komórkami. Proces starzenia istotnie wpływa na budowę płytki paznokciowej, wskutek czego paznokieć z czasem coraz bardziej wysusza się i zawiera coraz mniej lipidów. Powoduje to zwiększenie ryzyka zakażeń. Excilor® wzbogacony jest w glicerol, którego cząsteczki przyciągają wodę. Zawiera ponadto lipidy pielęgnujące paznokcie oraz biotyne. Kombinacja tych składników zmiękcza, nawadnia i odżywia płytkę paznokciową.

Instrukcja użycia

Przed użyciem preparatu Excilor® oczyścić paznokcie, a jeśli pokryty jest lakierem należy go zmyć.

Za pomocą aplikatora nałożyć obficie preparat Excilor® na całą powierzchnię paznokcia oraz jego brzegi od spodu. Należy nałożyć tylko na paznokcie, unikając kontaktu z otaczającą go skórą. Przed założeniem skarpetek lub obuwia należy odczekać 1 - 2 minuty do czasu wyschnięcia paznokcia, co pozwoli na wniknięcie preparatu do wnętrza paznokcia. Po nałożeniu preparatu odczuwalne może być mrowienie pod paznokciem, oznaczające, że preparat wniknął w paznokieć.

Preparat nakładać na zakażone miejsce dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Aby uzyskać najlepsze rezultaty stosować preparat przez co najmniej trzy miesiące i kontynuować do czasu odrosnięcia zdrowego paznokcia.

Podczas nakładania preparatu nie przyciskać mocno aplikatora.

Po każdym zastosowaniu należy szczelnie zamknąć aplikator, aby zapobiec parowaniu preparatu.

Opakowanie produktu Excilor® zawiera:

- Szyft: zawartość opakowania wystarcza na około 400 aplikacji lub
- Roztwór: 3,3 ml lub 7 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Działania niepożądane

Uczucie pieczenia, świąd lub łagodny, miejscowy ból.

Zgłaszano pojedyncze przypadki odklejania się paznokcia i pęcherzy wokół paznokcia.

Ryzyko uczulenia u pacjentów z nadwrażliwością, w wywiadzie, na jeden lub kilka składników preparatu. Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem.

W przypadku podejrzenia wystąpienia incydentów lub w przypadku reklamacji związanych z tym produktem prosimy o kontakt z producentem za pośrednictwem strony internetowej www.excilor.com. Jest to istotne z uwagi na ciągłe monitorowanie stosunku korzyści ze stosowania produktu do ryzyka z nim związanego. Ponadto w przypadku podejrzenia wystąpienia poważnych incydentów związanych z tym produktem prosimy o kontakt z producentem za pośrednictwem strony internetowej www.excilor.com oraz z incydenty@urpl.gov.pl.

Środki ostrożności

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi obficie spłukać wodą.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Diabetycy, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Excilor®.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośrednio działających promieni słonecznych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Zużytych aplikatorów nie wkładać do ognia.

Skład

Mleczan etylu, woda, glikol decylenowy, izosorbid dimetylu, eter stearylowy PPG-15, kwas octowy, etoksyloglany i acetylowany alkohol lanolinowy, glicerol, kopolimer metakrylanu amonu, biotylna (nie zawiera parabenów).



Ostatnia aktualizacja instrukcji: sierpień 2021 r.

	PL	CZ	RO	SK
	OBJAŚNIENIE SYMBOLI	OBJASNĚNÍ SYMBOLŮ	OBJASNĚNÍ SYMBOLŮ	VYSVĚTLIVKY SYMBOLOV
	Limit temperatury	Teplotní limit	Teplotní limit	Teplotný limit
	Instrukcja użycia	Pokyny k použití	Pokyny k použití	Návod na použitie
	Wyrób medyczny	Zdravotnický prostředek	Zdravotnický prostředek	Zdravotnícka pomôcka
	Ostrzeżenie	Varování	Varování	Upozomenie
	Seria	Kód šarže	Kód šarže	Kód šarže
	Termin ważności	Datum expirace	Datum expirace	Dátum expirácie
	Producent	Výrobce	Výrobce	Výrobca
	Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci	Składuje mimo dohled a dosah dětí	Składuje mimo dohled a dosah dětí	Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
	Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego	Składuje mimo teplo a přímé sluneční světlo	Składuje mimo teplo a přímé sluneční světlo	Chránite pred teplom alebo priamym slnečným svetlom
	Dystrybutor	Distributor	Distributor	Distribútor
	Europejska procedura oceny zgodności dla wyrobów medycznych	Postup pro hodnocení shody s evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky.	Postup pro hodnocení shody s evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky	Európsky postup posudzovania shody zdravotníckych pomôcok.

1591/620279/21H/07020726/0

Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 MERELBEKE
BELGIUM

VE10/143