

PL

Excilor® FORTE Color

Excilor® FORTE Color do leczenia zainfekowanych paznokci.

MD

CE

1639

Wyrób medyczny

Kosmetyczny lakier do paznokci pokrywający zdrowe paznokcie.

Kiedy należy stosować lakier Excilor® FORTE Color ?
Produkt do leczenia grzybiczego zakażenia paznokci u stóp (grzybica paznokci) u osób dorosłych.

- **Leczy i kryje kolorem**
- **Ekstra mocny** przeciw grzybicy paznokci
- Klinicznie udowodnione działanie
- Lakier do paznokci leczniczy, kolorowy + Lakier do paznokci klasyczny, kolorowy
- 24 h powolnej penetracji

Przed leczeniem należy uważnie przeczytać ulotkę.

Czym jest grzybica paznokci?
Grzybica paznokci to zakażenie paznokci wywołane przez dermatofity. Infekcja zwykle zaczyna się od krawędzi paznokcia i zmienia jego kolor na białawo-żółty, brązowy lub zielony. Grzyb wrasta pod paznokieć lub w paznokieć i powoduje zgrubienie i odłamywanie się płytki paznokciowej. Czasami zniekształcony paznokieć częściowo lub całkowicie schodzi, co może być bolesne.

Jak można zarazić się grzybicą paznokci?
Grzybicy paznokci sprzyja nadmiar wilgoci, ciepło, pocenie się, starzenie się organizmu lub osłabienie układu odpornościowego. Zwykle płytka paznokciowa jest zbyt gruba, aby grzyby mogły w nią wnikać. Natomiast uszkodzone paznokcie łatwo mogą ulec zakażeniu. Zbyt ciasne buty i/lub nadmierna potliwość stóp stwarzają warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania się grzybów. Infekcje grzybicze są zakaźne i mogą przenosić się na inne osoby (np. poprzez korzystanie z ogólnodostępnych pryszniców). Możliwe jest również samozakażenie: infekcja może szerzyć się z jednego paznokcia na drugi. Niektóre osoby (pacjenci chorujący na cukrzycę, pacjenci stosujący kortykosteroidy, pacjenci z osłabionym układem odpornościowym) są bardziej podatne na zakażenia grzybicze. Dlatego ważne jest, aby zacząć leczyć grzybicze zakażenie paznokci jak najszybciej: im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym krócej będzie ono trwało. Wczesne leczenie może również zapobiec rozszerzeniu się infekcji na inne paznokcie.

Jak można zapobiegać grzybicy paznokci?
Należy regularnie myć stopy. W przypadku używania mydła należy dokładnie spłukać stopy, aby usunąć wszelkie jego pozostałości.
Stopy należy dokładnie osuszać, zwłaszcza przestrzenie między palcami.
Należy nosić czyste bawełniane lub wełniane skarpetki.
Należy nosić buty, które pozwalają stopom „oddychać” i nie są zbyt ciasne.
Należy regularnie zmieniać buty.
Należy używać produktu przeciwgrzybiczego do butów.
W miejscach, gdzie wiele osób chodzi boszo, na przykład w ogólnodostępnych prysznicach, szatniach i na basenach, należy nosić klapki.

Jak stosować produkt Excilor® FORTE® Color?
1. Produkt **Excilor® FORTE® Color** należy stosować raz dziennie, najlepiej po skorzystaniu z prysznica. Przed nałożeniem produktu należy oczyścić paznokieć i usunąć ewentualny uprzednio nałożony lakier do paznokci. **Przed nałożeniem produktu dobrze wstrząsnąć butelką.**
2. Następnie należy nałożyć jednolitą warstwę produktu **Excilor® FORTE® Color** na całą powierzchnię paznokcia. Delikatnie usunąć nadmiar produktu z brzegów otaczającej skóry. Butelka może zawierać kłaczki zaschniętego produktu. Zetrzeć kłaczki zaschniętego produktu z pędzelka. Jest to normalne zjawisko spowodowane wysychaniem w wyniku kontaktu z powietrzem. Nie ma to wpływu na działanie i jakość produktu.
3. Poczekać do wyschnięcia paznokcia. Zajmie to od **3 do 5 minut**. Produkt ma czerwony kolor. Powstaje lekko błyszcząca powłoka. Dla optymalnego efektu zaleca się odczekać do 5 minut przed założeniem skarpetek i/ lub butów. Po aplikacji uczucie mrowienia pod paznokciem jest normalne i wskazuje, że produkt wnika w paznokieć. Nie należy nakładać produktu na zdrowe paznokcie.
4. Uformowana powłoka jest wodoodporna i wytrzymuje standardowe pocieranie i tarcie. Powłoka może odpryskiwać na krawędziach paznokcia, ale nie wpływa to na skuteczność produktu.
5. **Po 24 godzinach należy usunąć lakier.** Można to zrobić odklejając powłokę na brzegu lub z boku paznokcia. **Delikatnie zwinąć powłokę, aż zostanie ona w całości zdjęta z paznokcia.** Użycie przy tym ciepłej wody może okazać się pomocne. Nałożyć produkt na nowo zgodnie z powyższą instrukcją. Dokładnie umyć ręce po każdym usunięciu i kolejnym nałożeniu produktu. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy całkowicie pokrywać produktem paznokieć przez minimum trzy miesiące i kontynuować leczenie do całkowitego wyzdrowienia paznokcia.
Należy upewnić się, że butelka jest dokładnie zamknięta po każdym zabiegu, aby zapobiec parowaniu zawartości. Na brzegu szkła może wytworzyć się powłoka.

Jak działa produkt Excilor® FORTE Color?
Najważniejszym składnikiem paznokci palców stóp i rąk jest keratyna; twarda i gęsta substancja, przez którą większość preparatów przeciwgrzybiczych nie może przeniknąć. W większości przypadków grzyby rozwijają się pod paznokciem, co utrudnia leczenie.
Produkt **Excilor® FORTE Color** kontroluje mikrośrodowisko paznokcia poprzez zakwaszenie jego macierzy. Produkt **Excilor® FORTE Color zawiera substancje kwasowe**, które wnikają w paznokieć, co umożliwia leczenie od wewnątrz. Zwykle paznokieć odzyskuje całkowicie zdrowy wygląd po kilku miesiącach. Paznokcie u nóg rosną średnio 1,5 mm w ciągu miesiąca. Produkt **Excilor® FORTE Color** natychmiast obniża wartość pH paznokcia, tworząc środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzybów. Jednakże odrośnięcie uszkodzonego paznokcia wymaga czasu.
Skuteczność leczenia udowodniono w badaniach klinicznych.

 **Środki ostrożności**
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nakładać tylko na paznokcie, unikać kontaktu produktu z otaczającą skórą.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku dostania się produktu do oczu lub błon śluzowych należy dokładnie przepłukać je wodą.
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
Pacjenci chorujący na cukrzycę, u których występują problemy ze stopami powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu **Excilor® FORTE Color**.
Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Leczenie jest kontynuowanie leczenia do czasu całkowitego wyzdrowienia paznokcia. Jeśli po 3 miesiącach leczenia nie widać żadnych efektów, należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

Możliwe działania niepożądane
Uczucie pieczenia, swędzenie lub łagodny, miejscowy ból.
W przypadku podejrzenia wystąpienia incydentów lub w przypadku reklamacji związanych z tym produktem prosimy o kontakt z producentem za pośrednictwem strony internetowej **www.excilor.com**. Jest to istotne z uwagi na ciągłe monitorowanie stosunku korzyści ze stosowania produktu do ryzyka z nim związanego. Ponadto w przypadku podejrzenia wystąpienia poważnych incydentów związanych z tym produktem prosimy o kontakt z producentem za pośrednictwem strony internetowej **www.excilor.com** oraz **incydenty@urpl.gov.pl**.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku rozpoznanej nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

Skład
Skład produktu Excilor® FORTE Color Nude:
poliuretan-32, woda, kwas octowy (3,00% w/w), jodopropynylobutylokarbaminian, seskwioleinian sorbitanu, polisorbat 80, octan cetylu, acetylowany alkohol lanolinowy, kwas dehydrooctowy, alkohol benzylowy, alkohol fenyletylowy, etyloheksylogliceryna, 1,2-heksanodiol, glikol kaprylowy, biotyna, guma ksantanowa, mleczan alikilu C12-13, olej Pinus Sylvestris, Ci 77891, Ci 11680, Ci 12490, Ci 74160, gliceryna.

Skład produktu Excilor® FORTE Color Red:
poliuretan-32, woda, kwas octowy (3,00% w/w), jodopropynylobutylokarbaminian, seskwioleinian sorbitanu, polisorbat 80, octan cetylu, acetylowany alkohol lanolinowy, kwas dehydrooctowy, alkohol benzylowy, alkohol fenyletylowy, etyloheksylogliceryna, 1,2-heksanodiol, glikol kaprylowy, biotyna, guma ksantanowa, mleczan alikilu C12-13, olej Pinus Sylvestris, Ci 11680, Ci 12490, gliceryna.

Nie zawiera parabenów.

Warunki przechowywania
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze (5-25°C), z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
Przed nałożeniem produktu dobrze wstrząsnąć butelką.

Opakowanie wyrobu medycznego:

Butelka **30 ml**

Opakowanie kosmetyku - lakieru do paznokci - 8 ml

8 ml e



Skład lakieru do paznokci (kosmetyku) NUDE

SKŁADNIKI/INGREDIENTS: BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, ACRYLATES COPOLYMER, STEARALKONIUM BENTONITE, n-BUTYL ALCOHOL, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, Ci 77891, SILICA, BENZOPHENONE-1, TRIMETHYLPENTANEDIYL DIBENZOATE, POLYVINYL BUTYRAL, Ci 19140, Ci 77491, DIACETONE ALCOHOL.

Skład lakieru do paznokci (kosmetyku) RED

SKŁADNIKI/INGREDIENTS: BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER, ISOPROPYL ALCOHOL, ACRYLATES COPOLYMER, STEARALKONIUM BENTONITE, n-BUTYL ALCOHOL, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, Ci 19140, Ci 77491, Ci 15850, SILICA, BENZOPHENONE-1, Ci 77891, TRIMETHYLPENTANEDIYL DIBENZOATE, POLYVINYL BUTYRAL, DIACETONE ALCOHOL.

Medi-fill BV - Egelskoog 9 - NL 1822 BM, Alkmaar

Opakowanie i data ważności

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Data ostatniej aktualizacji : październik 2022 r.

KONTAKT

Zgłaszanie incydentów lub reklamacji dostępne na stronie www.excilor.com

PL - Objaśnienie poszczególnych symboli ■ RO - Explicația simbolurilor respective

PL - Instrukcja użycia
RO - Instrucțiunile de utilizare

PL - Uwaga
RO - Atenție

PL - Limity temperatury
RO - Limită de temperatură

PL - Data ważności
RO - Data expirare

PL - Numer serii
RO - Număr lot

PL - Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego
RO - A se feri de lumina soarelui

PL - Dystrybutor
RO - Distribuitor

PL - Producent
RO - Producător

1707/620018/22J/07020752/0

 Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 MERELBEKE
BELGIUM

VE11671